

US 362

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୩୦-୧୩୫ ଦିନ
- » ଲମ୍ବା ଏବଂ ଘନ କେଣ୍ଡା
- » ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାର ଅତୁଟ କ୍ଷମତା




US 382

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୨୫-୧୩୦ ଦିନ
- » ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କେଣ୍ଡା
- » ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାର ଅତୁଟ କ୍ଷମତା



US 312

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୨୦-୧୨୫ ଦିନ
- » ମରୁଡ଼ି ସହନଶୀଳ
- » ଖାଇବାକୁ ଘାସି
- » ଖାଇବା ପାଇଁ ଘାସି



US 312 Gold

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୨୦-୧୨୫ ଦିନ
- » ସୁସ୍ଥ ଜର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଗନ୍ଧ ଗଛ
- » ଖାଇବା ପାଇଁ ଘାସି



US 324

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୨୫-୧୨୮ ଦିନ
- » ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର ଅତୁଟ କ୍ଷମତା
- » ଜୀବାଣୁ ପତ୍ର କ୍ଲୋରୋ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ



US 321

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୧୫ - ୧୨୦ ଦିନ
- » ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର ଅତୁଟ କ୍ଷମତା
- » ବେକ ଭାଙ୍ଗିବା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ



US 318

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ଅବଧି ୧୧୫ ରୁ ୧୧୭ ଦିନ
- » ମୋଟା ଏବଂ ଓଜନବାର ବାନା
- » ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର ଅତୁଟ କ୍ଷମତା
- » ବେକ ଭାଙ୍ଗିବା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ



US 305

- » ଫସଲ ପାଚିବାର ସମୟ ୧୩୦-୧୩୫ ଦିନ
- » ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାର ଅତୁଟ କ୍ଷମତା
- » ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କେଣ୍ଡା



ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ଚାଷ ର ପଦ୍ଧତି

ନର୍ସରୀ ପ୍ରବନ୍ଧନ

ସମତଳ ଖେତରେ ୨.୫ ମିଟର ଚୌଡ଼ା ଏବଂ ଲମ୍ବାଇ ୧୦ ମିଟର ଅଥବା ଆବଶ୍ୟକତାନୁସାରେ ତଥା ଭଜତା ୫-୧୦ ସେ.ମି. ଆକାରର କ୍ୟାରିଡ଼ିଆରି କରିବା ଭରିତ ଯେଉଁଥିରେ ଯଥା ଜଳ ନିକାସି ହୋଇପାରିବ। ୨୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୩ କିଣ୍ଟାଲ ଗୋବର ର ଖତ ବିହନ ବୋଇବା ର ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୫ କିଲୋ ଇଉରିଆ, ୩.୭୫ କିଲୋ DAP ଏବଂ ୧.୨୫ କିଲୋ MOP କୁ ବେସାଲ ଡୋଜ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩.୭୫ କିଲୋ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୬ କିଲୋ ବିହନ କୁ ୧୨ ରୁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହାକୁ କାର୍ବେନଡାମିନ (୫୦% WP) ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କିଲୋ ବିହନ ର ଦରରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଭରମ ଅଳ୍ପରଖ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ କୁ ଛାୟାରେ ବୋରି ରେ ଭାଜି ୧୮-୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।

- ଅଳ୍ପଭିତ୍ତି ବାନ୍ଧକୁ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରର ଦରରେ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ଥ ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାନୁସାରେ ପୌଧ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଖରପତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

ମୁଖ୍ୟ ଖେତ ର ତିଆରି

- ମୁଖ୍ୟ ଖେତକୁ ୨ ରୁ ୩ ବାର ଜୋଡିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଚାହା ପରେ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଇବାର ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣରେ ଗୋବର ର ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟାଗୋପଣ ରୁ ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୫୦% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ପୋଟାଶ ତଥା ଫସ୍ଫୋରସର ପୂରା ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଖେତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତଳ କରନ୍ତୁ।
- ୨୧ ରୁ ୨୫ ଦିନର ବୁଆ ଗଛ ୨ ରୁ ୩ ସେ.ମି. ଗଭୀରତାରେ ୨ ରୁ ୩ ଫୁଟା ଗଛ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜିର ପଛକୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛ ରୁ ଗଛ ୧୫ ସେ.ମି. ର ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ।

ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧନ

- ଭର୍ବରକର ବ୍ୟବହାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ର ସିଫାରିଶ ର ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଭର୍ବରକ ର ସାଧାରଣ ସୁପାରିଶକୃତ ପରିମାଣ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାଲିକା ଅନୁସାରେ ଅଛି।

ଭର୍ବରକ	ଅନୁସଂସିତ ମାତ୍ରା
ଗୋବର ଖତ	୩ ରୁ ୪ ଟନ/ଏକର
ୟୁରିଆ	୧୦ କିଗ୍ରା/ଏକର
ଡି ଏ ପି	୫୦ କିଗ୍ରା/ଏକର
ଏମ ଓ ପି	୪୦ କିଗ୍ରା/ଏକର

- ୟୁରିଆ ର ସମ୍ବଦାନ ପରିମାଣକୁ ତିନି ଥର ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଭରିତ- ୫୦% ବେସାଲ ଡୋଜ୍ ଭାବରେ, ୨୫% ଟିଲିଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଶେଷ ୨୫% ବୁଟିଂ ଚରଣରେ। ପୋଟାସିୟମ ୫୦% ବେସାଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଶେଷ ୫୦% ପ୍ରି-ବୁଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ। ଭରମ ଭପର ପାଇଁ ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଆୟରନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଭରିତ।

ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ

- ଚଳି ଅବସ୍ଥା, ପିଲ ଧରିବାର ସମୟ, ପୃଷ୍ଠାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବାର ଅବସ୍ଥା ଧାନର ଫସଲ ରେ ଜଳ ର କ୍ରାନ୍ତିକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଖେତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ ୨ ରୁ ୩ ସେ.ମି. ଜଳ ସ୍ତର ବଜାଳ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକତମ ଟିଲିଫ୍ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ସ୍ତରକୁ ୪ ରୁ ୫ ସେ.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଚାହା ପରେ ଧାନ ପାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ସ୍ତରକୁ ୪ ରୁ ୫ ସେ.ମି. ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ।

ଖରପତ୍ର/ଅବରକାରୀ ଗଛ/ ଘାସ ପ୍ରବନ୍ଧନ

- ଖରପତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖରପତ୍ର ନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
- ପ୍ରେଟିଲ୍‌ଲୋର ୫୦ EC ୫୦୦ ମିଲି/ଏକର ରୋପାଇର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାଜରିବାକ୍ ସୋଡିୟମ @ ୧୨୦ ମିଲି/ଏକର ଖରପତ୍ରର ୨-୪ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ। ଖରାପ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଖରପତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଛିଟିରେ ପାୟରାଡୋକ୍ସିଫ୍ୟୁରନ ବିଶ୍ୱାଜରିବାକ୍ ସୋଡିୟମ (୮୦ ଗ୍ରାମ ୧୦୦ ମି.ଲି./ଏକର) କୁ ୪-୬ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ରୋଗ ଏବଂ କୀଟ ପ୍ରବନ୍ଧନ

କୀଟ	ପ୍ରବନ୍ଧନ
ତମା ଛେଦକ	ଟ୍ରାପୋନିଲ ୮୦% WG @ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ/ଏକର ବିଶ୍ୱା ଫୁଲ୍‌ବେଣ୍ଡିଆଲ୍‌ଡି ୪୮୦ SC ୨୦ ମିଲି/ଏକର ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବି.ପି.ଏଚ	ବୁପ୍ରୋଥେଜିନ ୨୫% W/W SC @ ୩୨୦ ମିଲି/ଏକର ବିଶ୍ୱା ପାୟମେନ୍‌ଡୋଜିନ @ ୧୨୦ ଗ୍ରାମ/ଏକରର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ରୋଗ	ପ୍ରବନ୍ଧନ
ବି ଏଲ ବି	ଷ୍ଟେପ୍‌ସୋଲିସିନ ୮ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ/ଏକରର ଛିଡ଼ିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦ ଦିନ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଅଧିକତା ରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ଝୁଲିଆ କିମ୍ବା ଖୋଜା	ଚେବୁକୋନାଗୋଲ ୫୦% + ଗ୍ରାଉଥ୍‌ଫୋର୍ଟିଫିକ୍ ୨୫% w / w WG (୭୫ WG) ୮୦g/m / ଏକର
ଶୀଘ୍ର ଝୁଲିବ	ଏଡୋକ୍ସିଫ୍ୟୁରିନ ଚେବୁକୋନାଗୋଲ @ ୩୩୦ ମିଲି/ଏକର ବିଶ୍ୱା ପେନସିଫ୍ୟୁରନ ୨୫୦ SC @ ୨୪୦ ରୁ ୩୦୦ ମିଲି/ଏକରର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
କଣ୍ଡୁଆ	ବୁଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରି-ହାର୍‌ବିଂ ଚରଣରେ ପ୍ରୋପିକୋନାଗୋଲ @ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ମିଲି/ଏକରର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଭର୍ବରକର ଅଧିକ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାରରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।

କଟାଓ: ଯେତେବେଳେ ୮୦ ରୁ ୮୫% ବାମା ସୁନା ରକମ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ସବୁଜ ରହେ, ଫସଲର କାଟିବା ଭରିତ।