

US 7711

- » ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಅವಧಿ: 80-85 ದಿನಗಳು
- » ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ
- » ದಪ್ಪ ಕಾಳಿನ ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ತೆನೆಗಳು
- » ಉತ್ತಮ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಸಿರು ಮೇವು
- » ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ



US 7773

- » ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 75-78 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಫಸಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
- » ದಟ್ಟವಾದ, ದೃಢವಾದ, ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ತೆನೆಗಳು.
- » ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳುಗಳು, ಮೇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- » ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
- » ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ



ಸಜ್ಜೆ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು:

ಕ್ಷೇತ್ರ ತಯಾರಿ:

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ತಿರುಗಿಸುವ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಳವಾದ ಹದವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಳುಮೆ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು

ಬಿತ್ತನೆ:

ಬಿತ್ತುವ ಸಮಯ (ಖರೀಫ್):	ಜೂನ್-ಜುಲೈ
ಬಿತ್ತುವ ಸಮಯ (ಬೇಸಿಗೆ):	ನವೆಂಬರ್ 20- ಜನವರಿ
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣ	1.5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್/ ಎಕರೆ
ಅಂತರ	45 ಸೆಂ.ಮೀ. x 15 ಸೆಂ.ಮೀ.
ಆಳ	2-3 ಸೆಂ.ಮೀ.

ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ:

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

• ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ: 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್/ ಎಕರೆ

ಗೊಬ್ಬರ	ಬೆಸೆಲ್ (ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಮೊದಲ ನೀರಿನ ಸಮಯ (ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಒಟ್ಟು (ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ):
ಯೂರಿಯಾ	18	52	70
ಡಿಎಪಿ	35		35
ಎಮ್‌ಒಪಿ	20		20

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ:

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು 25-30 ದಿನಗಳು (ಕವಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ) ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುವ ಹಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ:

- ಬಿತ್ತಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ 10-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು 25-50% ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಅಟ್ರಿಬ್ಯುನ್ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 500 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. .

ಕೀಟ & ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ:

ವಿಶೇಷತೆ	ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ	ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ಗಿಡಗಳು ರೋಗಸಂವಾಗುವಾಗ ಪೂಜಿ ಕೊನಾಜೋಲ್ @ 1 ಮಿ.ಲೀ./ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್	ರೋಗಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ; ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 4% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64% @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್	ಥೈಮೋಕ್ಸಾಮ್ 0.9% + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 0.2% ಜಿಆರ್ @ 5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ
ಶೂಟ್	ಬಿತ್ತನೆ 10-15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆನೊಫೋಸ್ @ 20 ಮಿ.ಲೀ./15 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ತೆನೆ ಹುಳು	ಕೊರಜೆನ್ @ 6 ಗ್ರಾಂ/15 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟೆಂಬೋರರ್	ಕೊರಜೆನ್ @ 6 ಗ್ರಾಂ/15 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸೈಪರ್‌ಮೆಥಿನ್ + ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ @ 25 ಮಿ.ಲೀ./15 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ಹುಲ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆ	ಸೈಪರ್‌ಮೆಥಿನ್ + ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫಾಸ್ @ 25 ಮಿ.ಲೀ./15 ಲೀ. ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ

ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ:

ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದರೆ, ಕಾಳುಗಳ ಹಿಲಾರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಪಕ್ವವಾದಾಗ. ಬೆಳೆ ಬಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ 13% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ (ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವು 12% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು