

US 6201

- » પાકવાનો સમયગાળો: 130 થી 135 દિવસ
- » આકર્ષક, સ્વાદિષ્ટ અને ઝીણા દાણા
- » પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ટકી રહેવાની ક્ષમતા



US 6206

- » પાકવાનો સમયગાળો: 120-125 દિવસ
- » લાંબી, ગાઢ સળીઓ સાથે પુષ્કળ દાણા
- » ઝીણા દાણા
- » પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ટકી રહેવાની ક્ષમતા



હાઇબ્રિડ ડાંગરની ખેતી પદ્ધતિ

નર્સરી મેનેજમેન્ટ

- » સપાટ ખેતરમાં, 2.5 મીટર પહોળાઈ અને 10 મીટર લંબાઈ અથવા જરૂરિયાત મુજબ અને 5-10 સે.મી. ઊંચાઈનો ક્યારી તૈયાર કરો જેથી યોગ્ય પાણી નિકાલ શક્ય બને.
- » 400 ચોરસ મીટર વિસ્તાર માટે, વાવણીના 2 અઠવાડિયા પહેલાં 3 ક્વિન્ટલ ગાયના છાણ ખાતરનો ઉપયોગ કરો અને મૂળભૂત માત્રા તરીકે 5 કિલો યુરિયા, 3.75 કિલો ડીએપી અને 1.25 કિલો એમઓપીનો ઉપયોગ કરો અને 15 દિવસ પછી પ્રતિ ચોરસ મીટર વિસ્તાર 3.75 કિલો યુરિયાનો ઉપયોગ કરો.
- » વધુ સારી રીતે અંકુરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, 6 કિલો બીજને 8-10 કલાક માટે પલાળી રાખો અને તેમને 18-24 કલાક માટે છાંયડામાં બોરીઓમાં રાખો.
- » અંકુરિત બીજને 20-25 ગ્રામ પ્રતિ ચોરસ મીટરના દરે સમાન રીતે વાવો.
- » સ્વસ્થ નર્સરી ઊગાડવા માટે, જરૂરિયાત મુજબ છોડના રક્ષણ અને નીંદણ નિયંત્રણ માટે પગલાં લો.

મુખ્ય ખેતરની તૈયારી

- » મુખ્ય ખેતરને 2-3 વાર ખેડાણ કરીને સારી રીતે તૈયાર કરો, પછી સિંચાઈ કરો અને રોપણી કરતા 2 અઠવાડિયા પહેલાં ભલામણ કરેલ માત્રામાં ખાતરનો ઉપયોગ કરો.
- » રોપણી કરતા એક દિવસ પહેલાં 50% નાઇટ્રોજન અને પોટાશ અને ફોસ્ફરસનો સંપૂર્ણ જથ્થો નાખો, અને ખેતરને સારી રીતે સમતલ કરો.
- » 21-25 દિવસના રોપાઓ 2-3 સેમી ઊંડાઈએ દરેક જગ્યાએ 2-3 છોડના દરે વાવો અને એક લાઈન થી બીજી લાઈન 20 સેમી અને એક છોડથી બીજા છોડમાં 15 સેમીનું અંતર રાખો.

પોષક તત્વોનું સંચાલન

- » માટી પરીક્ષણ અહેવાલો અને સ્થાનિક રાજ્ય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓની ભલામણોના આધારે ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખાતરોની સામાન્ય ભલામણ કરેલ માત્રા નીચે આપેલા કોષ્ટક મુજબ છે.

ખાતર	ખાતરભલામણ કરેલ જથ્થો
ગાયનું છાણ ખાતર	3-૪ ટન/એકર
યુરિયા	૯૦ કિગ્રા/એકર
ડીએપીએમ	૫૦ કિગ્રા/એકર
એમઓપી	૪૦ કિગ્રા/એકર

- » યુરિયાનો કુલ જથ્થો ત્રણ ડોઝમાં આપવો જોઈએ - ૫૦% પાયામાં ડોઝ તરીકે, ૨૫% કુટાન આવવાના સમયે પર અને બાકીનો ૨૫% કંઠી આવવાના સમયે પર. પોટેશિયમ - ૫૦% પાયામાં ડોઝ તરીકે અને બાકીનો ૫૦% કંઠી આવવાના સમયે પર. સારી ઉપજ માટે ઝીંક અને આયર્ન પણ આપવું જોઈએ.

પાણી વ્યવસ્થાપન

- » ડાંગરના પાકમાં પાણીના નિર્ણાયક તબક્કાઓ રોપાનો તબક્કો, ખેડાણનો તબક્કો, ફૂલોનો પ્રારંભ અને કંઠી નીકળવાનો તબક્કો છે. શરૂઆતના 30 દિવસ સુધી મુખ્ય ખેતરમાં પાણીનું સ્તર 2-3 સેમી રાખો. મહત્તમ ખેડાણના તબક્કો સુધી પાણીનું સ્તર 4-5 સેમી સુધી વધારો. ત્યારબાદ ડાંગર પાકે ત્યાં સુધી પાણીનું સ્તર 4-5 સેમી રાખો. લણણીના 10 દિવસ પહેલાં પાણી સંપૂર્ણપણે કાઢી નાખો.

નીંદણ વ્યવસ્થાપન

- » નીંદણ વ્યવસ્થાપનના સારા સંચાલન માટે નીચેના નિદેશનાશકોનો ઉપયોગ કરો:
- » રોપણી પછી 24 કલાકની અંદર પ્રીટીલાક્ટોર 50 ઇસી @ 500 મિલી/એકર.
- » નીંદણના 2-4 પાન તબક્કામાં બિસ્પાયરીબેક સોડિયમ @ 120 મિલી/એકર.
- » નબળા પાણી વ્યવસ્થાપન અને મિશ્ર નીંદણના ઉચ્ચ દબાણના કિસ્સામાં 4-6 પાન તબક્કામાં પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન + બિસ્પાયરીબેક સોડિયમ (80 ગ્રામ + 100 મિલી/એકર) નો ઉપયોગ કરો.

છોડની સુરક્ષા

જીવાતો	વ્યવસ્થાપન
ગાંઠની ઈયળ	ફિપ્રોનીલ 80% WG @ 20-25 ગ્રામ/એકર અથવા ફ્લુબેન્ડિયામાઇડ 480 SC @ 20 મિલી/એકર છંટકાવ કરો
બી.પી.એચ.	બુપ્રોફેઝિન 25% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ એસસી @ 320 મિલી/એકર અથવા પાયમેટ્રોઝિન @ 120 ગ્રામ/એકર છંટકાવ કરો.
રોગ	વ્યવસ્થાપન
બી એલ બી	સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસીન ૮ ગ્રામ + કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ @ ૪૦૦ ગ્રામ/એકર છંટકાવ કરો અને ૧૦ દિવસ પછી પુનરાવર્તન કરો. નાઇટ્રોજનનો વધુ પડતો ઉપયોગ ટાળો.
સુકારો અથવા ફૂગ	ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સીસ્ટ્રોબિન 25% w/w WG (75 WG) 80gm/acre
પતિમાં ફૂગ	એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન + ટેબુકોનાઝોલ @ ૩૩૦ મિલી/એકર અથવા પેન્સીક્સુરોન ૨૫૦ એસસી @ ૨૪૦-૩૦૦ મિલી/એકર છંટકાવ કરો.
કંડુવા	ફૂલો આવતા પહેલાં અને ખીલવાના તબક્કામાં પ્રોપીનોનાઝોલ @ 200-250 મિલી/એકર છંટકાવ કરો. નાઇટ્રોજન ખાતરોનો વધુ પડતો ઉપયોગ ટાળો.

કાપણી: જ્યારે ૮૦-૮૫% દાણા સોનેરી પીળા રંગના થાય અને દાંડી લીલી થઈ જાય ત્યારે પાકની કાપણી કરવી જોઈએ.